

**QUESTIONÁRIO DE QUALIDADE DE VIDA EM PACIENTES COM HIPERIDROSE PRIMÁRIA.** José Ribas Milanez de Campos, Paulo Kauffman, Eduardo de Campos Werebe, Laert Oliveira Andrade Filho, Sergio Kuzniek, Nelson Wolosker, Fábio Biscegli Jatene, Mariane Amir. **J Pneumol** 2003;29(4):178-81.

**Introdução:** Hiperidrose ou sudorese excessiva é um distúrbio crônico associado a sofrimento subjetivo importante. **Objetivo:** Apresentar um questionário específico para avaliar a qualidade de vida em pacientes com hiperidrose. **Métodos:** De outubro de 1995 a março de 2002, 378 pacientes, com idade média de 26,8 anos, sendo 234 do sexo feminino, foram avaliados antes e depois da simpatectomia torácica por videotoracoscopia. **Resultados:** Sucesso terapêutico foi obtido em 90% dos procedimentos. A taxa de recorrência foi de 10% para hiperidrose palmar e 11% para hiperidrose axilar; 27% desses pacientes foram reoperados com sucesso. Nenhuma complicação séria foi registrada. Do número total de pacientes, 91% responderam ao questionário sobre qualidade de vida e, desses, 86% referiram melhora após o procedimento. **Conclusões:** A simpatectomia torácica é um método terapêutico capaz de mudar a qualidade de vida dos pacientes com hiperidrose, o que pôde ser comprovado pelo questionário utilizado.